

**Ligne directrices en
matière d'autorisation
préalable
avril 201**



Lignes directrices en matière d'autorisation préalable

Veillez prendre note que le médicament faisant l'objet de la demande d'autorisation préalable ne doit pas être administré en milieu hospitalier et que tous les traitements antérieurs pertinents doivent être énumérés dans le formulaire de demande. Le présent document vise à faciliter la tâche des prescripteurs et ne constitue pas une liste exhaustive des critères d'approbation relatifs à l'autorisation préalable.

Médicament	Maladie
Abstral	- Douleur cancéreuse (percées de douleur)
Actemra	- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) - Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIp) - Arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIs) - Artérite à cellules géantes
Adcirca et génériques	- Hypertension artérielle pulmonaire (HAP)
Addyi	- Trouble lié à la baisse du désir sexuel acquis
Adempas	- Hypertension pulmonaire thromboembolique chronique (HPTEC) non résécable - HPTEC persistante ou récurrente après le traitement chirurgical - Hypertension artérielle pulmonaire (HAP)
Afinitor	- Adénocarcinome rénal - Astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes (ASCG) associé à la sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) - Tumeurs neuroendocrines pancréatiques (TNEP) - Tumeurs neuroendocrines du tube digestif ou du poumon - Angiomyolipome rénal associé à la sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) - Cancer du sein avancé
Afinitor Disperz	- Astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes (ASCG) associé à la sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) - Convulsions associées à la sclérose tubéreuse de Bourneville (STB)
Aimovig	- Prévention de la migraine
Inhibiteur de l'alpha1-protéinase	- Maladies rares
Alecensaro	- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Alunbrig	- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Arzerra	- Leucémie lymphoïde chronique (LLC)
Aubagio	- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR)
Avastin	- Cancer colorectal - Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé, métastatique ou récidivant - Glioblastome - Cancer épithélial de l'ovaire, cancer des trompes de Fallope et cancer péritonéal primaire
Banzel	- Convulsions associées au syndrome de Lennox-Gastaut



Bavencio	<ul style="list-style-type: none">- Carcinome à cellules de Merkel (CCM) métastatique- Carcinome urothélial localement avancé ou métastatique
Benlysta	<ul style="list-style-type: none">- Lupus érythémateux disséminé (LED)
Besponsa	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)
Bosulif	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase accélérée ou en crise blastique
Botox	<ul style="list-style-type: none">- Blépharospasme- Dystonie cervicale- Spasticité focale (y compris pour le traitement de la spasticité des membres supérieurs associée à l'AVC)- Pied bot équin- Strabisme- Migraine chronique- Hyperactivité neurogène du détrusor- Vessie hyperactive
Brenzys	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)- Spondylarthrite ankylosante
Cabometyx	<ul style="list-style-type: none">- Adénocarcinome rénal
Caprelsa	<ul style="list-style-type: none">- Cancer médullaire de la thyroïde
Carbaglu	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Cerdelga	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Cimzia	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)- Arthrite psoriasique- Spondylarthrite ankylosante- Psoriasis en plaques
Cinqair	<ul style="list-style-type: none">- Asthme éosinophile grave
Constella	<ul style="list-style-type: none">- Syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C)- Constipation idiopathique chronique (CIC)
Cosentyx	<ul style="list-style-type: none">- Psoriasis en plaques (modéré à grave)- Arthrite psoriasique- Spondylarthrite ankylosante
Cotellic	<ul style="list-style-type: none">- Mélanome non résecable ou métastatique
Crysvita	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Cuvposa	<ul style="list-style-type: none">- Sialorrhée chronique chez les patients atteints de troubles neurologiques
Cyramza	<ul style="list-style-type: none">- Cancer gastrique avancé- Adénocarcinome de la jonction gastro-œsophagienne
Cystadrops	<ul style="list-style-type: none">- Dépôts cornéens de cristaux de cystine chez les patients atteints de cystinose
Daklinza	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C chronique
Demylocan	<ul style="list-style-type: none">- Syndromes myélodysplasiques (SMD)
Diacomit	<ul style="list-style-type: none">- Convulsions tonico-cloniques généralisées réfractaires chez les patients atteints d'épilepsie myoclonique sévère du nourrisson (EMSN, syndrome de Dravet)
Duodopa	<ul style="list-style-type: none">- Maladie de Parkinson
Dupixent	<ul style="list-style-type: none">- Dermatite atopique (modérée à grave)
Dysport Therapeutic	<ul style="list-style-type: none">- Dystonie cervicale- Spasticité focale des membres supérieurs (chez les adultes)- Spasticité focale des membres inférieurs (chez les enfants)



Egrifta	- Patients infectés par le VIH et atteints de lipodystrophie
Enbrel	- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave) - Arthrite juvénile idiopathique (AJIp) - Arthrite psoriasique (AP) - Spondylarthrite ankylosante - Psoriasis en plaques (modéré à grave)
Entyvio	- Colite ulcéreuse (modérée à grave) - Maladie de Crohn (modérée à grave)
Epclusa	- Infection chronique par le virus de l'hépatite C avec ou sans cirrhose
Erelzi	- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave) - Arthrite juvénile idiopathique (AJIp) - Spondylarthrite ankylosante - Arthrite psoriasique (AP)
Erivedge	- Carcinome basocellulaire localement avancé ou métastatique
Erleada	- Cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique (CPRCnm)
Esbriet	- Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) chez l'adulte
Eylea	- Forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge - Déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique (OMD) - Déficience visuelle due à un œdème maculaire attribuable à une occlusion de la veine centrale de la rétine (OVCR) ou à une occlusion de la veine rétinienne (OBVR) brachiale - Néovascularisation choroïdienne myopique
Fabrazyme	- Maladies rares
Fampyra	- Amélioration symptomatique de la marche chez les patients atteints de sclérose en plaques (SEP) qui présentent une altération de la marche
Fasenra	- Asthme éosinophile sévère
Fentora	- Accès douloureux transitoires d'origine cancéreuse
Firazyr	- Maladies rares
Forteo	- Ostéoporose sévère chez les femmes ménopausées présentant un risque élevé de fractures - Ostéoporose sévère primaire ou causée par un hypogonadisme chez les hommes lorsqu'un autre traitement contre l'ostéoporose a échoué ou n'a pas été toléré - Ostéoporose associée à une thérapie systémique prolongée aux glucocorticoïdes chez les hommes et les femmes présentant un risque accru de fractures
Galafold	- Maladies rares
Galexos	- Hépatite C chronique
Gazyva	- Leucémie lymphoïde chronique (LLC) - Lymphome folliculaire
Genotropin	- Déficit en hormone de croissance chez les enfants et les adultes - Petite taille idiopathique - Enfants nés petits pour l'âge gestationnel - Syndrome de Turner
Gilenya	- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) chez les adultes - Sclérose en plaques récurrente (SEP-R) chez les enfants



Giotrif	<ul style="list-style-type: none">- Adénocarcinome métastatique du poumon- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Hadlima/Hadlima PushTouch	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (modérée à grave)- Arthrite psoriasique (AP)- Spondylarthrite ankylosante- Psoriasis en plaques (modéré à grave)- Maladie de Crohn (modérée à grave ou fistulisante) chez les adultes)- Colite ulcéreuse (modérée à grave)- Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIp)- Hidrosadénite suppurée- Uvéite non infectieuse chez les adultes
Hanzema	<ul style="list-style-type: none">- Formes sévères d'eczéma chronique des mains
Harvoni	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C avec ou sans cirrhose
Hizentra	<ul style="list-style-type: none">- Déficit immunitaire primaire (DIP) et déficit immunitaire secondaire (DIS)- Polyneuropathie inflammatoire démyélinisante chronique (PIDC)
Holkira Pak	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C du génotype 1, avec ou sans cirrhose
Humatrope	<ul style="list-style-type: none">- Déficit en hormone de croissance (adultes et enfants)- Petite taille idiopathique- Déficit du gène SHOX (<i>short stature homeobox-containing gene</i>)- Enfants nés petits pour l'âge gestationnel- Syndrome de Turner
Humira	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)- Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIp)- Arthrite psoriasique (AP)- Spondylarthrite ankylosante- Psoriasis en plaques (modéré à grave)- Maladie de Crohn (modérée à grave ou fistulisante) chez les adultes et les enfants- Colite ulcéreuse (modérée à grave)- Hidrosadénite suppurée- Uvéite non infectieuse chez les adultes et les enfants
Ibavyr	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C chronique
Ibrance	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du sein localement avancé ou métastatique
Iclusig	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie myéloïde chronique (LMC)- Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)
Idhifa	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie myéloïde aiguë (LMA)
Ilaris	<ul style="list-style-type: none">- Syndromes périodiques associés à la cryopyrine (CAPS)- Arthrite juvénile idiopathique systémique (AJIS) évolutive- Fièvre méditerranéenne familiale (FMF)- Syndrome périodique associé au récepteur du facteur de nécrose tumorale (TRAPS)- Maladies rares
Imbruvica	<ul style="list-style-type: none">- Lymphome à cellules du manteau (LCM) en rechute ou réfractaire- Leucémie lymphoïde chronique (LLC)- Macroglobulinémie de Waldenström- Maladie chronique du greffon contre l'hôte (GVH chronique)- Lymphome de la zone marginale (LZM)
Imfinzi	<ul style="list-style-type: none">- Carcinome urothélial localement avancé ou métastatique



	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé, non résecable
Inflectra	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)- Arthrite psoriasique (AP)- Spondylarthrite ankylosante- Psoriasis en plaques chronique (modéré à grave)- Maladie de Crohn (modérée à grave ou fistulisante)- Colite ulcéreuse (modérée à grave)
Inlyta	<ul style="list-style-type: none">- Adénocarcinome rénal métastatique (ARm)
Iressa	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Jakavi	<ul style="list-style-type: none">- Myélofibrose primitive (myélofibrose idiopathique chronique)- Myélofibrose consécutive à une polyglobulie essentielle- Myélofibrose consécutive à une thrombocythémie essentielle- Contrôle de l'hématocrite chez les patients adultes atteints de polycythémie vraie
Jetrea	<ul style="list-style-type: none">- Adhésion vitréomaculaire symptomatique (AVM)
Jinarc	<ul style="list-style-type: none">- Maladie polykystique rénale autosomique dominante (MPRAD)
Juxtapid	<ul style="list-style-type: none">- Hypercholestérolémie familiale homozygote (HcFH)
Kalydeco	<ul style="list-style-type: none">- Fibrose kystique (FK)
Kevzara	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)
Keytruda	<ul style="list-style-type: none">- Mélanome non résecable ou métastatique- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique- Lymphome de Hodgkin classique (LHc)- Carcinome urothélial localement avancé ou métastatique- Lymphome médiastinal primitif à cellules B (LMPCB)
Kineret	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde- Maladie inflammatoire multi-système à début néonatal
Kisqali	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du sein avancé ou métastatique
Kuvan	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Lemtrada	<ul style="list-style-type: none">- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR)
Lenvima	<ul style="list-style-type: none">- Cancer différencié de la thyroïde (CDT) localement récidivant ou métastatique, évolutif et réfractaire à l'iode radioactif- Adénocarcinome rénal avancé- Carcinome hépatocellulaire (CHC) non résecable
Lonsurf	<ul style="list-style-type: none">- Cancer colorectal (CCR) métastatique
Lorbrena	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique
Lucentis	<ul style="list-style-type: none">- Forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)- Déficience visuelle due à un œdème maculaire diabétique (OMD)- Déficience visuelle due à un œdème maculaire secondaire à une occlusion veineuse rétinienne (OVR)- Déficience visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) secondaire à une myopie pathologique (MP)- Déficience visuelle due à une néovascularisation choroïdienne (NVC) qui n'est pas secondaire à la forme néovasculaire (humide) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou à la myopie pathologique
Lynparza	<ul style="list-style-type: none">- Cancer épithélial séreux de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou d'un carcinome péritonéal primitif



	- Cancer du sein métastatique
Macugen	- Néovascularisation choroïdienne (NVC) sous-fovéale secondaire à la dégénérescence maculaire liée à l'âge
Mavenclad	- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR)
Maviret	- Hépatite C chronique avec ou sans cirrhose compensée
MDK-Nitisinone	- Maladies rares
Mekinist	- Mélanome non résecable ou métastatique - Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique
Movantik	- Constipation liée aux opioïdes chez les adultes
Movapo	- Maladie de Parkinson (modérée ou avancée)
Mvasi	- Carcinome métastatique du côlon ou du rectum - Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique ou non résecable
Nexavar	- Carcinome hépatocellulaire (CHC) non résecable - Adénocarcinome rénal localement avancé ou métastatique - Cancer différencié de la thyroïde (CDT) en progression localement avancé ou métastatique
Ninlaro	- Myélome multiple
Nitisinone	- Maladies rares
Norditropin NordiFlex	- Déficit en hormone de croissance chez les enfants - Trouble de croissance chez l'enfant
Norditropin Simplexx	- Déficit en hormone de croissance chez les enfants - Trouble de croissance chez l'enfant
Nplate	- Purpura thrombocytopénique immunologique (idiopathique) (PTI) chronique
Nucala	- Asthme éosinophile grave - Granulomatose éosinophile avec polyangéite
Nutropin	- Retard de croissance associé à une insuffisance rénale chronique chez les enfants - Déficit en hormone de croissance (adultes et enfants) - Syndrome de Turner
Ocaliva	- Cholangite biliaire primitive (CBP)
Ocrevus	- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR) - Sclérose en plaques progressive primaire (SPPP) au stade précoce
Ofev	- Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI)
Olumiant	- Polyarthrite rhumatoïde (modérée à grave)
Omnitrope	- Déficit en hormone de croissance (enfants et adultes) - Petite taille idiopathique - Enfants nés petits pour l'âge gestationnel - Syndrome de Turner
Opdivo	- Mélanome non résecable ou métastatique - Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique - Adénocarcinome rénal avancé ou métastatique - Lymphome de Hodgkin - Épithélioma malpighien spinocellulaire de la tête et du cou récurrent ou métastatique - Carcinome hépatocellulaire (CHC) avancé ou métastatique
Opsumit	- Hypertension artérielle pulmonaire (HAP)
Orencia	- Polyarthrite rhumatoïde (PAR)



	<ul style="list-style-type: none">- Arthrite juvénile idiopathique (AJIp)- Polyarthrite juvénile (PJ)- Arthrite psoriasique (AP)
Orfadin	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Orkambi	<ul style="list-style-type: none">- Fibrose kystique (FK)
Otezla	<ul style="list-style-type: none">- Psoriasis en plaques (modéré à grave)- Arthrite psoriasique
Oxervate	<ul style="list-style-type: none">- Kératite neurotrophique modérée ou grave
Pheburane	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Pomalyst	<ul style="list-style-type: none">- Myélome multiple
Praluent	<ul style="list-style-type: none">- Hypercholestérolémie familiale (HF) hétérozygote- Maladie cardiovasculaire (MCV) artérioscléreuse cliniquement manifeste
Prolastin	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Ravicti	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Relistor	<ul style="list-style-type: none">- Constipation liée aux opioïdes
Remicade	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)- Arthrite psoriasique (AP)- Spondylarthrite ankylosante- Psoriasis en plaques chronique (modéré à grave)- Maladie de Crohn (modérée à grave ou fistulisante)- Colite ulcéreuse (modérée à grave)
Renflexis	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (modérée à grave)- Spondylarthrite ankylosante- Maladie de Crohn (modérée à grave ou fistulisante)- Colite ulcéreuse (modérée à grave)- Arthrite psoriasique (AP)- Psoriasis en plaques
Repatha	<ul style="list-style-type: none">- Maladie cardiovasculaire (MCV) artérioscléreuse cliniquement manifeste- Hypercholestérolémie familiale (HF) hétérozygote- Hypercholestérolémie familiale homozygote (HcFH)
Revatio et génériques	<ul style="list-style-type: none">- Hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAPP)- Hypertension artérielle pulmonaire (HAP) secondaire à une affection des tissus conjonctifs
Revestive	<ul style="list-style-type: none">- Syndrome de l'intestin court (SIC)
Revlimid	<ul style="list-style-type: none">- Myélome multiple- Anémie justiciable de transfusions
Revolade	<ul style="list-style-type: none">- Purpura thrombocytopénique immunologique (idiopathique) (PTI) chronique- Anémie aplasique grave
Rituxan/Rituxan SC	<ul style="list-style-type: none">- Lymphome non hodgkinien (LNH)- Leucémie lymphoïde chronique (LLC)- Polyarthrite rhumatoïde (PAR)- Granulomatose avec polyangéite (GPA, ou granulomatose de Wegener) et polyangéite microscopique
Rydapt	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie myéloïde aiguë- Mastocytose systémique agressive (MSA), mastocytose systémique associée à une autre hémopathie maligne (MS-AHM) ou leucémie à



	mastocytes (LM)
Saizen	<ul style="list-style-type: none">- Déficit en hormone de croissance (enfants et adultes)- Retard de croissance associé à une insuffisance rénale chronique (chez les enfants)- Enfants nés petits pour l'âge gestationnel- Syndrome de Turner
Samsca	<ul style="list-style-type: none">- Hyponatrémie non hypovolémique ou hyponatrémie symptomatique
Sativex	<ul style="list-style-type: none">- Douleur associée à un cancer avancé- Sclérose en plaques – douleur neuropathique- Sclérose en plaques – spasticité
Serostim	<ul style="list-style-type: none">- Cachexie attribuable au VIH avec catabolisme, perte de poids ou émaciation
Signifor	<ul style="list-style-type: none">- Maladie de Cushing
Signifor LAR	<ul style="list-style-type: none">- Acromégalie
Siliq	<ul style="list-style-type: none">- Psoriasis en plaques
Simponi	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)- Arthrite psoriasique (AP)- Spondylarthrite ankylosante- Spondylarthrite axiale non radiographique (nr-Ax SpA)- Colite ulcéreuse (modérée à grave)
Somavert	<ul style="list-style-type: none">- Acromégalie
Sovaldi	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C chronique
Sprycel	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique, en phase d'accélération ou en crise blastique- Leucémie lymphoblastique aiguë (LLA)
Stelara	<ul style="list-style-type: none">- Arthrite psoriasique (AP)- Psoriasis en plaques chronique (modéré à grave)- Maladie de Crohn (modérée à grave)
Stivarga	<ul style="list-style-type: none">- Cancer colorectal (CCR) métastatique- Carcinome hépatocellulaire (CHC)
Sunvepra	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C chronique
Sutent	<ul style="list-style-type: none">- Tumeur stromale gastro-intestinale (TSGI)- Adénocarcinome rénal métastatique (ARM)- Tumeurs neuroendocrines (TNE) pancréatiques bien différenciées, non résécables et évolutives, à un stade avancé ou métastatique
Symdeko	<ul style="list-style-type: none">- Fibrose kystique (FK)
Tafinlar	<ul style="list-style-type: none">- Mélanome métastatique ou non résécable- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique- Traitement adjuvant du mélanome
Tagrisso	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Takhzyro	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Taltz	<ul style="list-style-type: none">- Psoriasis en plaques (modéré à grave)- Arthrite psoriasique
Tarceva	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Tasigna	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique nouvellement diagnostiquée- Leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique ou



	<p>d'accélération</p> <ul style="list-style-type: none">- Leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique chez les enfants
Tecentriq	<ul style="list-style-type: none">- Carcinome urothélial localement avancé ou métastatique- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Tecfidera	<ul style="list-style-type: none">- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR)
Technivie	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C chronique
Tegsedi	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Temodal et génériques	<ul style="list-style-type: none">- Glioblastome multiforme (nouvellement diagnostiqué)- Glioblastome multiforme ou astrocytome anaplasique pour lequel une première récurrence de la tumeur ou l'évolution de la maladie a été documentée après l'administration d'un traitement type
Thalomid	<ul style="list-style-type: none">- Myélome multiple (jamais traité auparavant)
Toctino	<ul style="list-style-type: none">- Formes sévères d'eczéma chronique des mains
Treanda	<ul style="list-style-type: none">- Lymphome non hodgkinien (LNH) à cellules B indolent en rechute- Leucémie lymphoïde chronique (LLC) symptomatique n'ayant jamais été traitée auparavant
Tremfya	<ul style="list-style-type: none">- Psoriasis en plaques chronique (modéré à grave)
Tykerb	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du sein métastatique
Tysabri	<ul style="list-style-type: none">- Sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-RR)
Upravi	<ul style="list-style-type: none">- Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique (HTAPI)- Hypertension artérielle pulmonaire héritable (HTAPH)- Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) associée à une affection du tissu conjonctif- Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) associée à une cardiopathie congénitale
Vectibix	<ul style="list-style-type: none">- Carcinome colorectal métastatique
Venclexta	<ul style="list-style-type: none">- Leucémie lymphoïde chronique (LLC)
Vidaza	<ul style="list-style-type: none">- Syndrome myélodysplasique (SMD) de risque intermédiaire-2 et élevé- Leucémie myéloïde aiguë (LMA)
Vimizim	<ul style="list-style-type: none">- Maladies rares
Vizimpro	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Volibris	<ul style="list-style-type: none">- Hypertension artérielle pulmonaire idiopathique (HTAPI)- Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) associée à une collagénose- Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) chez des patients adultes qui présentent des symptômes de classe fonctionnelle II ou III selon l'OMS
Vosevi	<ul style="list-style-type: none">- Hépatite C chronique avec ou sans cirrhose
Votrient	<ul style="list-style-type: none">- Adénocarcinome rénal métastatique (ARm) à cellules claires- Sarcome des tissus mous (STM)
Xalkori	<ul style="list-style-type: none">- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) avancé ou métastatique
Xeljanz	<ul style="list-style-type: none">- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)- Arthrite psoriasique



	- Colite ulcéreuse évolutive modérée ou sévère
Xeljanz XR	- Polyarthrite rhumatoïde (PAR) (modérée à grave)
Xeomin	- Blépharospasme - Dystonie cervicale - Spasticité focale
Xermelo	- Diarrhée réfractaire associée au syndrome carcinoïde
Xiaflex	- Contracture de Dupuytren avec cordon palpable - Maladie de La Peyronie chez les hommes qui présentent une plaque palpable et une difformité de courbure d'au moins 30 degrés
Xolair	- Asthme allergique persistant modéré à grave - Urticaire idiopathique chronique
Xtandi	- Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) - Cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (CPRCnm)
Yervoy	- Mélanome non résecable ou métastatique - Adénocarcinome rénal au stade avancé ou métastatique associé à un risque intermédiaire ou élevé
Zavesca	- Maladies rares
Zaxine	- Réduction du risque d'encéphalopathie d'origine hépatique - Syndrome du côlon irritable avec diarrhée
Zelboraf	- Mélanome non résecable ou métastatique
Zemaira	- Maladies rares
Zepatier	- Hépatite C chronique
Zolinza	- Lymphome cutané à cellules T (LCCT) à un stade avancé
Zydelig	- Leucémie lymphoïde chronique (LLC) - Lymphome folliculaire
Zykadia	- Cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique
Zytiga	- Cancer de la prostate métastatique